

BULLETIN DE VEILLE HYDROLOGIQUE

Sécheresse

4

Le 06 Août 2026



BASSIN
DU LOING

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Agir ensemble au service des rivières

SITUATION HYDROLOGIQUE ACTUELLE

La situation hydrologique du bassin du Loing poursuit sa dégradation dans un contexte de déficit pluviométrique persistant et de fortes chaleurs. Les précipitations orageuses observées ces dernières semaines sont restées trop faibles et localisées pour permettre un soutien durable des débits des cours d'eau. Sur les sept derniers jours, les cumuls enregistrés restent limités, avec environ 16 mm relevés à Nemours et seulement 6,8 mm à Amilly, confirmant le caractère insuffisant et hétérogène des apports pluviométriques récents. Les situations d'étiage sévère continuent ainsi de se généraliser.

Le Loing amont passe en situation d'alerte renforcée malgré le soutien encore assuré par les débits réservés des étangs du Bourdon et de Moutiers. Les débits des principaux affluents poursuivent leur diminution sous l'effet du déficit hydrique. Les faibles précipitations enregistrées récemment n'ont pas permis d'apporter un soutien significatif et durable aux écoulements.


En rive gauche du Loing, le soutien des eaux souterraines reste insuffisant pour maintenir des écoulements pérennes en tête de bassin. Les assecs continuent de progresser et se généralisent désormais sur l'ensemble de la rive gauche, où les cours d'eau restent fortement impactés par la diminution des apports de la nappe des calcaires de Beauce.

En rive droite du Loing, malgré les apports encore présents de la nappe de la Craie du Gâtinais, les cours d'eau montrent également des signes de dégradation avec une diminution progressive des débits. Les résurgences permettent toutefois de maintenir certains écoulements sur les secteurs aval, mais la situation reste préoccupante et continue d'évoluer défavorablement.

Compte tenu de la poursuite de la dégradation de la situation hydrologique, les mesures de restriction des usages de l'eau restent en vigueur et ont été renforcées sur plusieurs secteurs du bassin. Dans le Loiret, vingt-neuf zones de gestion sont désormais concernées par des mesures de limitation des usages de l'eau, avec des niveaux de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise selon les bassins versants. Les départements de l'Yonne (89) et de Seine-et-Marne (77) maintiennent également des mesures adaptées à l'évolution de la situation hydrologique.

→ Pour obtenir davantage d'informations sur la localisation des points de contrôle des étiages sur le territoire, nous vous invitons à consulter la plateforme En quête d'eau : <https://jeparticipe-enquetedeau.eaufrance.fr/>.

CARTOGRAPHIE DES ZONES D'ALERTE DU BASSIN
VERSANT DU LOING AU 06/08/2026



Secteur Fusin et Secteur Montargois (Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson)

Sur le Puiseaux, les premiers tronçons en assec ont été observés au niveau du franchissement de la D41 (route de Nogent), alors que le cours d'eau est encore alimenté en amont, aux Choux et à Langesse, par ses sources issues des sables de Sologne. Cette situation a entraîné la mortalité des peuplements piscicoles. Le constat d'assec se poursuit en aval, où seules quelques poches d'eau résiduelles subsistent, mais celles-ci se ressuient rapidement. Les débits du Puiseaux enregistrés par la station hydrométrique à Saint-Hilaire sont quasi nuls depuis la fin du mois de juin.

En tête de bassin du Vernisson, le ru de Courcelles est totalement à sec, seules quelques poches d'eau résiduelles étant encore présentes. À Boismorand, sur les secteurs de travaux de l'EPAGE du Bassin du Loing, la nappe qui affleurait en amont de l'étang de Cormont, dans le futur lit du Vernisson, n'est désormais plus visible et le lit actuel est à sec. Les écoulements reprennent toutefois dans l'emprise de l'ancien étang grâce à une petite source de la nappe de la Craie, toujours active à ce jour et dont le débit semble rester relativement constant dans le temps.

À Nogent-sur-Vernisson, les écoulements ont fortement diminué, avec un risque de rupture au niveau du micro-seuil en palplanches situé en amont de la zone humide.

Sur les bassins du Fusin et de la Bezonde, la situation de crise se maintient, sans recensement de nouveaux secteurs en assec. Les débits, bien que faibles, semblent demeurer relativement stables.

À l'instar du Puiseaux et du Vernisson, le Solin est lui aussi confronté à un assec généralisé au sein duquel perdurent encore quelques poches d'eau, létales pour la faune aquatique. En effet, l'eau résiduelle se réchauffe et provoque la disparition complète de l'oxygène, conduisant à des mortalités piscicoles sur plusieurs secteurs. Une veille attentive permet d'adapter au mieux la mise en œuvre d'actions de sauvetage en partenariat avec la Fédération de Pêche du Loiret.



Betz

À Chevannes, le Betz bénéficie toujours de plusieurs apports pérennes grâce aux résurgences de la nappe de la Craie présentes dans cette commune. Ce soutien d'étiage permet de maintenir un écoulement dans le Betz et sur la partie aval (650 m) de son principal affluent, le Ru de Sainte-Rose, malgré des conditions hydrologiques déficitaires. En revanche, en amont de Chevannes, le ru de Sainte-Rose est à sec sur une grande partie de son linéaire.

La station hydrométrique de Bransles a enregistré un débit moyen journalier de 160 l/s au 20 juillet 2026. Des augmentations de débit sont enregistrées en fin de week-end et jusqu'au début de la semaine, avec des augmentations pouvant atteindre jusqu'à 60l/s au droit de la station de mesure en trois jours. Ces fluctuations s'expliquent probablement par l'arrêt momentané des prélèvements agricoles dans la nappe durant le week-end imposé par l'arrêté de restriction des usages de l'eau en vigueur. La remontée progressive de la nappe durant cette période permet d'augmenter ponctuellement le débit des sources et des apports diffus par le fond du lit de la rivière.




CLÉRY

À ce jour, la Cléry demeure l'un des rares cours d'eau du bassin du Loing à présenter une situation de sécheresse hydrologique parmi les moins marquées du bassin. Son régime reste en effet largement soutenu par les apports de la nappe de la Craie, ce qui permet de maintenir des débits relativement stables malgré les conditions estivales.

La Cléry a toutefois franchi le seuil d'alerte (600 l/s) dans la journée du 27 juillet sur les chroniques de mesure continue de la station. Un jaugeage manuel réalisé le 21 juillet affichait déjà un débit de 556 l/s.

À Vernoy, la source de la Cléry ne présente plus d'écoulement et le lavoir associé est quasiment à sec. Plus en aval, les différentes résurgences et sources situées entre Savigny-sur-Clairis et Courtenay contribuent encore au soutien d'étiage du cours d'eau, permettant de maintenir un débit d'environ 30 l/s en amont de la confluence avec le ru de Bougis.

À partir de ce secteur, plusieurs affluents pérennes, notamment le ru de Bougis et le Pense-Folie, renforcent progressivement les débits de la Cléry. Ces apports contribuent au maintien d'un écoulement soutenu jusqu'à la confluence avec le Loing.




Ouanne Amont et Sources du Loing


Sur le bassin amont de l'Ouanne, la dégradation de la situation hydrologique conduit au passage en alerte renforcée. Une baisse généralisée des débits est observée sur l'ensemble des cours d'eau, avec une aggravation des conditions d'écoulement sur les têtes de bassin où des assecs, absents lors des précédentes reconnaissances, sont désormais constatés.

À Charny-Orée-de-Puisaye, la station hydrométrique enregistrait un débit moyen journalier de l'Ouanne de 480 l/s au 30 juillet 2026 contre 1 100 l/s le 20 juillet 2026, confirmant la poursuite de la diminution des écoulements. Si les conditions météorologiques restent défavorables dans les prochains jours, de nombreux cours d'eau, dont les écoulements sont désormais très faibles, sont susceptibles de connaître des assecs. Cette dégradation est d'ores et déjà visible sur certains affluents. Sur le Branlin, à hauteur du hameau des Gâtines, sur la commune de Saints-en-Puisaye, un assec du cours d'eau a été observé.

En amont de l'étang de Moutiers, le Loing est toujours en eau à Saint-Sauveur-en-Puisaye, bien que les écoulements ne soient pas visibles. Le ru du Bourdon est principalement alimenté par les transferts d'eau entre l'étang de Moutiers et la rigole de Saint-Privé. La restitution des débits réservés du canal du Loing permet de soutenir le cours d'eau. Le débit instantané du Loing à Montbouy est malgré tout passé sous le seuil de crise le 29 juillet, sans franchissement durable de ce seuil. Dans la journée du 31 juillet, le débit est passé sous le seuil d'alerte renforcée. À ce jour, le secteur du Loing dans l'Yonne est réglementairement toujours en alerte.



SITUATION HYDROGÉOLOGIQUE DES NAPPES




La situation des nappes sur le bassin poursuit sa dégradation, marquée par une baisse généralisée des niveaux piézométriques. Cette évolution traduit la poursuite de la vidange estivale des aquifères, en l'absence de précipitations efficaces permettant leur recharge. Les niveaux piézométriques atteints sont plus précoces par rapport aux normales.

En rive gauche du Loing, au sein des calcaires d'Étampes, la baisse des niveaux est particulièrement marquée sur le bassin de la Bezone. Le piézomètre de Villemoutiers enregistre le niveau le plus bas observé pour cette période de l'année. À l'inverse, sur le bassin du Fusin, les niveaux piézométriques demeurent globalement satisfaisants selon les mesures.

En rive droite du Loing, sur les secteurs du Loiret et de la Seine-et-Marne, les niveaux de la nappe décroient moins rapidement, entraînant tout de même l'assèchement de certaines sources en tête de bassin. Malgré cette baisse, les niveaux restent globalement supérieurs aux normales saisonnières sur ces secteurs. Les nappes continuent ainsi d'assurer un soutien d'étiage essentiel aux cours d'eau, tant sur le plan quantitatif, en maintenant les débits, que sur le plan qualitatif, grâce à leurs apports d'eau fraîche.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Après plusieurs journées marquées par des températures élevées, un rafraîchissement progressif s'installe sur le bassin du Loing. Des averses et orages localisés sont attendus en début de semaine, mais leur répartition hétérogène ne permettra vraisemblablement pas d'améliorer durablement la situation hydrologique. Les cumuls de précipitations devraient rester très variables d'un secteur à l'autre et bénéficier essentiellement aux zones directement concernées par les cellules orageuses.



Après plusieurs journées marquées par des températures élevées, un rafraîchissement progressif s'installe sur le bassin du Loing. Des averses et orages localisés sont attendus en début de semaine, mais leur répartition hétérogène ne permettra vraisemblablement pas d'améliorer durablement la situation hydrologique. Les cumuls de précipitations devraient rester très variables d'un secteur à l'autre et bénéficier essentiellement aux zones directement concernées par les cellules orageuses.

Pour les prochains jours, les températures devraient se maintenir proches, voire légèrement supérieures aux normales de saison. Malgré une baisse temporaire de l'évapotranspiration liée au rafraîchissement, les faibles apports pluviométriques généralisés ne devraient pas compenser le déficit hydrique accumulé. En conséquence, la diminution des débits des cours d'eau du bassin du Loing devrait se poursuivre, avec une vigilance particulière à maintenir sur les secteurs les plus sensibles.

02 38 28 55 11

contact@epageloing.fr

www.epageloing.fr

25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis